


CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS AVES MARINAS COMUNES EN LAS AGUAS ESPAÑOLAS



INDEMARES






garganta

ventre

flancos

**Infracoberteras
caudales**



PARDELAS Y PETRELES

Fulmar boreal
Petrel de Bulwer
Pardela cenicienta
Pardela sombría
Pardela capirotada
Pardela pichoneta
Pardela balear
Pardela mediterránea
Pardela chica

PAÍÑOS

Paíño pechialbo
Paíño de Wilson
Paíño común
Paíño de Madeira
Paíño de Leach

ALCATRACES

Alcatraz atlántico

CORMORANES

Cormorán moñudo
Cormorán grande

PÁGALOS

Págalo pomarino
Págalo parásito
Págalo rabero
Págalo grande

ALCIDOS

Arao común
Alca común
Frailecillo atlántico

GAVIOTAS

Gaviota cabecinegra
Gaviota enana
Gaviota de Sabine
Gaviota reidora
Gaviota picofina
Gaviota de Audouin
Gaviota cana
Gaviota argéntea
Gaviota sombría
Gaviota patiamarilla
Gavión atlántico
Gaviota tridáctila

CHARRANES

Charrán patinegro
Charrán común
Charrán ártico
Charrancito común

Pardelas y petreles



- 9 spp. y 6 spp. reproductoras
- Mediano-grande
- Pelágicas
- Pico característico
- Vuelo característico
- Buenos buceadores
- Gregarias
- Biología reproductiva particular

Pardela cenicienta



Pardela balear



Pardela mediterránea



Fulmar boreal



Pardela sombría



Petrel de Bulwer



Pardela capirotada



Pardela pichoneta



Pardela chica




Paíños



- 5 spp. y 3 spp. reproductoras
- Pequeños
- Pelágicas
- Pico característico
- Díficil identificación
- Tímidos
- Alimentación en superficie
- Biología reproductiva particular

Paíño común




Paíño pechialbo




Paíño de Wilson



Paíño de Madeira



Paíño boreal



Alcatraces



- 1 spp. no reproductora
- Grande
- Coloración característica
- Cinco clases de plumajes según la edad
- Silueta en cruz
- Picados característicos

Alcatraz atlántico



Cormoranes



- 2 spp. reproductoras
- Tamaño mediano-grande
- Cuello largo y cuerpo rechoncho
- Vuelo directo y pesado
- Coloración general oscura
- Buenos buceadores

Cormorán moñudo



Cormorán grande



Págalos





- 4 spp. no reproductoras
- Tamaño mediano-grande
- Vuelo ágil
- Tres de las cuatro spp. europeas presentan dos plumas sentrales más largas que el resto
- Fases de coloración (clara y oscura)
- Cleptoparasitismo

Págalo grande




Págalo parásito



Págalo pomarino



Págalo rabero



Gaviotas




- 12 spp. y 8 reproductoras
- Tamaño desde pequeño a grande
- Vuelo ágil
- Plumaje general de los adultos blanco con tonos grises o negros en las alas
- Jóvenes parduscos, algunas especies difíciles de identificar
- Picos y patas de colores (generalmente rojo, amarillo y negro)

Gaviota cabecinegra



Gaviota enana



Gaviota reidora



Gaviota picofina



Gaviota de Audouin



Gaviota sombría



Gaviota patiamarilla



Gaviota tridáctila



Gaviota de Sabine



Gaviota cana



Gaviota argéntea



Gavión atlántico



Charranes y fumareles



- 4 spp. y 3 reproductoras
- Tamaño desde pequeño-mediano
- Emparentados con las gaviotas, más estilizados
- Vuelo ágil y boyante
- Plumaje general de los adultos blanco con tonos grises o negros en las alas
- Cola ahorquillada
- Pescan zambulléndose desde el aire

Charrán patinegro



Charrán común



Charrancito común



Fumarel común



Charrán ártico




Álcidos



- 3 spp. no reproductoras
- Tamaño desde pequeño-mediano
- Cuerpo rechoncho y alas pequeñas
- Vuelo batido y directo
- Plumaje general oscuro en las partes superiores y blanco en las inferiores
- Grandes buceadores

Alca común



Frailecillo atlántico



Arao común



Muchas gracias por su atención

Fotografías: Beneharo Rodríguez, Juan Bécares, José Manuel Arcos, Juan Curbelo, Joao Corbina.
Dibujos: Juan Varela.